



2301 E. Allegheny Ave, Suite 120, Philadelphia, Pa 19134  
P: 267.639.6250 | F: 267.639.6270  
[www.specialsmilesd.com](http://www.specialsmilesd.com)

## INFORMACIÓN SOBRE EXTRACCIONES DENTALES

La filosofía de nuestra práctica dental es preservar toda la dentición (dentadura) de nuestros pacientes. Reconocemos la importancia de mantener todos los dientes para favorecer la apariencia, la función y los hábitos bucales generales de nuestros pacientes. Sin embargo, hay situaciones en las que la extracción dental es la mejor o única opción de tratamiento para la salud general y a largo plazo del paciente. Elegimos esta opción tras una cuidadosa evaluación.

Lea la siguiente información y comuníquese con nuestro consultorio con anticipación para aclarar cualquier duda que pueda tener con el dentista que le brindará atención antes de firmar el formulario de consentimiento para el tratamiento dental integral. El objetivo de esta lista es revisar los riesgos más comunes asociados con la extracción dental. Sin embargo, no se limita a lo siguiente:

- Molestias e hinchazón posoperatorias que pueden requerir varios días de recuperación en casa.
- Sangrado prolongado o abundante que puede requerir tratamiento o cirugía adicionales.
- Lesiones o daños en los dientes adyacentes, rellenos, restauraciones dentales o puentes.
- Infección posoperatoria que puede requerir tratamiento adicional, como internación y cirugía.
- Estiramiento de las comisuras de la boca que puede causar grietas y hematomas que pueden tardar en sanar.
- Dificultad para abrir la boca y dolor, a veces relacionado con la inflamación y el dolor muscular.
- La decisión de dejar un pequeño fragmento de raíz en la mandíbula cuando su extracción requeriría una cirugía extensa o conllevaría el riesgo de otras complicaciones.
- Una lesión en el nervio situado debajo de los dientes inferiores puede provocar entumecimiento temporal, dolor u hormigueo en el mentón, los labios, las mejillas, las encías o la lengua. Esto puede durar semanas, meses o, en casos excepcionales, puede ser permanente. En casos muy poco frecuentes, cuando se lesiona el nervio de la lengua, puede producirse una alteración del habla o del gusto.
- Apertura del seno maxilar (un espacio hueco en el hueso situado encima de los dientes superiores) que puede requerir una cirugía adicional o un tratamiento con antibióticos y descongestionantes nasales.

Entiendo que Special Smiles, Ltd. es un locatario autorizado de Commonwealth Campus y que el sistema de salud de Temple University Hospital no proporciona ningún servicio.